

# Cara Penggunaan Sediaan Sirup

## Sirup/Suspensi/Emulsi.

Obat sediaan sirup pasti sudah sering sekali digunakan apalagi buat anak-anak. Caranya dikocok dahulu sebelum diminum, kemudian gunakan sendok takar, pipet takar atau tutup takar dan minum sesuai dengan dosis dan cara pakai.



Obat dikocok dan disesuaikan Takaran Dosisnya



Melarutkan Sirup Kering



## Sirup Kering.

Sirup kering adalah obat serbuk yang harus dilarutkan terlebih dahulu dengan air minum sampai batas tanda, sebelum digunakan. Jika batas tanda tidak ada, dapat meminta bantuan Apoteker di apotek untuk melarutkan, jumlah air ditakar dengan gelas ukur.

Suspensi atau larutan ini biasanya mengandung **Antibiotik**, harus dihabiskan dan hanya dapat digunakan maksimal 7 hari setelah dilarutkan atau sesuai keterangan.



## INGAT WAKTU PEMAKAIAN OBAT

- Sebelum Makan : Obat diminum 30 menit sebelum makan
- Sesudah makan : Obat diminum 30 menit Setelah makan



- Dosis Obat 3 x 1 -  
dalam sehari (24 jam) obat  
diminum 3 kali dengan  
jeda 8 jam, Misalnya :



Obat ke 1 = jam 07.00

Obat ke 2 = jam 15.00

Obat ke 3 = jam 23.00

Ctt. Sama halnya dengan obat yang  
diminum 1x1 dan 2x1 tinggal  
sesuaikan waktunya.

# APA ITU SEDIAAN SIRUP ???

Ada 2 Macam Sediaan Sirup :  
Sirup Suspensi/Emulsi  
Dan Sirup Kering



Sirup adalah sediaan pekat dalam air dari gula atau pengganti gula dengan atau tanpa penambahan bahan pewangi dan zat obat. Serta Sirup kering adalah obat berupa bubuk kering yang harus ditambah dulu dengan sejumlah tertentu air sebelum dikonsumsi pasien. Ini dilakukan karena terdapat bahan obat yang tidak stabil dalam larutan berair, misalnya **Antibiotik**.

## CARA PENGGUNAAN SEDIAAN SIRUP



UNIT PROMOSI KESEHATAN  
RSUD PROF. DR. W. Z. JOHANNES  
KUPANG  
TAHUN 2019